



Wundanamnese:

Zustand nach Sehnenabriss der Strecksehne nach dem Hängenbleiben an einem Weidezaun.
OP in der Klinik, danach sechs Wochen Gips und Boxenruhe.

Wundbehandlung:

Nach der OP erfolgte eine systemische Langzeit-Antibiose aufgrund starker Infektion des OP-Bereiches inkl. Belägen und Nekrosen.

Ein chirurgisches Débridement erfolgte durch den Tierarzt, danach wurde die Wunde mit LIGASANO weiß versorgt. Im ersten Schritt wurde LIGASANO® weiß in der Größe 15 x 10 x 1 cm aufgelegt, darüber wurde eine 10 cm breite sterile LIGASANO® Binde gewickelt. Die Fixierung erfolgte mit LIGAMED® fix. Tägliche Wundreinigung mit Microdacyn und täglicher Verbandswechsel.



Abb. 1: 13.06.2016 Wundzustand am Tag der Gipsentfernung



Abb. 2: 19.06.2016 Zustand der Wunde nach einer Woche Wundbehandlung mit LIGASANO® weiß



Abb. 3: 21.06.2016 Beläge wurden gelöst und atraumatisch entfernt

Autorin:

Anne Krebs, Wundexpertin, Medizinprodukteberaterin, aus Mechernich