

H

LIGAMED® ITALIA

Experts for wound healing + prevention

SINI-MEDIK

Niederreiter GmbH



PLASTICA RICOSTRUTTIVA

ORTOPEDIA

GERIATRIA

CENTRO USTIONI

PRONTO SOCCORSO

ANGIOLOGIA

DERMATOLOGIA

TRAUMATOLOGIA

CHIRURGIA

lesione tibiale e tendinea

LIGASANO®

semplicemente funziona

AMBULATORIO
Via del Mucello 42, Perugia
Cellulare: 347 7154323

ABITAZIONE
Via Laura 1, Perugia
Telefono: 075 / 40293

P.I. 02818480549
C.F. BSCGR70D03G478M
ALBO ORD. MED. PG N. 6087

E-mail: bisacci@hotmail.com
www.societaitalianaflebologia.it

Dott. CARLO BISACCI
Medico Chirurgo
Flebologia e Medicina Estetica.
Specialista in Chirurgia Generale.

PERUGIA 13/02/07

S16. P M

77dc 86aa con recante ictus emisferico destro, IRC
Da circa 3-4 mesi notevole perdita di sostanza a livello
pettorale e primolombare a sinistra con aree neuro-
tiche, mal di stomaco recente e tendine d'Achille
lesione ulnocarpale e destra ben distesa.

Eseguito Ecodoppler venoso arti inferiori di
nostro cicolo venoso profondo femore popliteo
e sottopliteo per il bilaterale, riscontrando la
vene grande safene bilaterale fino alle cosce.
Ecodoppler arterioso arti inferiori di
nostro ciclo di patologia perinatale a carattere
di interessamento l'ase arterioso femore popliteo
bilateralmente determinando stenosi multiple
di non rilievo emodinamico (presenza di placche
femorali e poplitee bilaterali, presenti a
distale e destra, assenti a sinistra, dove il flusso

Doppler è monophasico con III non valutabile
(per incomprimibilità)

L'angiografia medicamentosa prelevata.
Controllare emorragie e funzionalità renale per
eventuale terapia antipertensiva dopo esecuzione
del tampone per esame colturale a livello della
lesione e sinistra.

Ecodoppler del controllo con scarse sensazioni.
Date le condizioni generali, il quadro clinico
strumentale (patologia sotto poplitea e sinistra)
e le note lesioni trofiche con maxime perdite di
sostanza non si ritiene indicato un intervento
di rivascolarizzazione ma una terapia asservita
va. In caso di peggioramento del quadro
clinico intervento di amputazione maggiore
arto inferiore sinistro.

doppler 13 febbraio

Dott. CARLO BISACCI
Chirurgia Generale, Medicina Estetica, F.
Amb.: Via del Mucello, 42 - Perugia - Tel. 347
Ab.: Via Laura, 1 - Perugia - Tel. 075
C. F. BSC GR 70 D 03 G 478 M
Partita IVA 02718480549

Dott. CARLO BISACCI
Chirurgia Generale, Medicina Estetica, F.
Amb.: Via del Mucello, 42 - Perugia - Tel. 347
Ab.: Via Laura, 1 - Perugia - Tel. 075
C. F. BSC GR 70 D 03 G 478 M
Partita IVA 02718480549

**In caso si peggioramento del quadro
clinico, intervento di amputazione
maggiore arto inferiore sinistro.**



13 Febbraio







13 Febbraio



18 Febbraio















20 Marzo





10 Aprile





20 Aprile



27 Aprile







10 Giugno









05 Luglio





16 Luglio





07 Agosto





01 Ottobre



29 Ottobre







28 Marzo

